



原末

「ケンエー」



第3類医薬品  
09×39.0

**ビタミンC「ケンエー」 第3類医薬品**

**△ 使用上の注意**

**△ 相換すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、  
歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

**△ 効能効果**

○ 次の諸症状の緩和：  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○ 次の場合の出血予防：  
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

○ 次の場合のビタミンCの補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

**【用法用量】**

15歳以上 1回1包

11歳以上15歳未満 1回2/3包

7歳以上11歳未満 1回1/2包

3歳以上7歳未満 1回1/3包

1歳以上3歳未満 1回1/4包

いずれも1日2～3回食後に服用してください。

＜用法用量に関連する注意＞

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法用量を厳守してください。

(3) 本剤は、1歳未満の乳児には服用させないでください。

**【成分量】**

本品 1包 (0.6g) 中 日局 アスコルビン酸 0.6g含有。

＜成分量に関連する注意＞

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

**副作用被害救済制度の問合せ先**

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

**健栄製薬株式会社**

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626


製造番号

使用期限

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

分包装 第3類医薬品

ビタミンC剤  
**ビタミンC**  
0.6g×60包 原末



4 19872861306674

分包装

ビタミンC剤

**ビタミンC**  
「ケンエー」

日本薬局方 アスコルビン酸

原末

0.6g×60包  
第3類医薬品

分包装

第3類医薬品

ビタミンC剤

**ビタミンC**  
「ケンエー」

原末



箱 分包装: PE金属

0.6g×60包