

のどの殺菌・消毒の

50mL Compound Iodine Glycerin

殺菌消毒剤

日本製薬株式会社

第2類医薬品

P
P

- * 使用上の注意のつづき
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔成分分量〕 100 mL中
 ヨウ素 1.2 g、液状フェノール 0.5 mL、グリセリン 90 mL含有
 添加物：ヨウ化カリウム、ハッカ水

副作用被害救済制度の間合せ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



御用印

登録商標

P

第2類医薬品

咽喉塗布剤

日本薬局方

複方ヨード・グリセリン

Compound Iodine Glycerin 50mL

【効能効果】 のどの殺菌・消毒

【用法用量】 適宜、適量を患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 塗布用のみ使用してください。
- (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 〈貯法〉
気密容器。避光して室温保存。



製造番号
使用期限

健栄製薬株式会社
 大阪中央区伏見町2丁目5番6号
 電話番号 06(6231)5626

⑥

ご使用に際しては、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人には使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 口内又はのどのひどいただれのある人。
 - (6) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
 - (7) 患部が広範囲の人。

*以下右側面へ

2405 001

CV-9 1208