

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

第2類医薬品

クレゾール液

(クレゾール42～52vol%を含有)

Saponated Cresol Solution

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
2. 次の部位には使用しないこと。

目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲の人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効 能 効 果】

手指・創傷面の殺菌・消毒

便所、便器、ごみ箱、たんつぼ、浄化そう等、疾病予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

次のように水で希釈して洗浄する。

1. 手指の消毒の場合：2%（本剤の50倍液）
2. 創傷面の殺菌の場合：1%（本剤の100倍液）
3. 便所等の消毒の場合：3%（本剤の33倍液）

<用法用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 外用にのみ使用すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

33倍液：本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。

50倍液：本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。

100倍液：本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

【成 分 分 量】

本品は、クレゾール42～52vol%を含む。

- 【保管及び取扱い上の注意】**
1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
 3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
 4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
 5. 本剤のクレゾール臭の移行を避けるため、保管には注意すること。
 6. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取り扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。)
- 【包装】** 100mL、500mL