

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

第3類医薬品

# オキシドール

Oxydol

## 【使用上の注意】



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能効果】

きずの消毒・洗浄

## 【用法用量】

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

### 〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

## 【成分分量】

過酸化水素 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 2.5～3.5w/v% を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

## 【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない冷所 (30℃以下) に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

### 〈貯法〉

気密容器。遮光して30℃以下で保存。

## 【包装】

100mL、500mL