

消毒薬

第3類医薬品

消毒用エタノールIP_{ケネイ}

アルコール類*水溶性*危険等級Ⅱ*火気厳禁*飲用不可

ETHANOL IP 「KENEI」 FOR DISINFECTION

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮ふ。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ぶ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効 能 効 果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用 法 用 量】 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

■使用する時に（500mLスプレー式に記載）



スプレーポンプのストッパーを矢印の方向に引き抜いて使用してください。使用後は、誤まって液が噴出しないようストッパーをして保管してください。

※初回使用時は液が出るまで数回トリガーを引いてください。

【成 分 分 量】 エタノール（C₂H₆O）76.9～81.4vol%を含有します。

添加物としてイソプロパノールを含有します。

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。（アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。）

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) ストープやコンロ等火気の近くで使用しないでください。（500mLスプレー式にのみ記載）
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。（500mLにのみ記載）
- (8) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。（変質又は変色のおそれがあります。）

〈貯法〉

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。

【包装】 100mL、100mL（スプレー式）、500mL、500mL（スプレー式）、5L