

制酸薬

日本薬局方

第3類医薬品

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

Sodium Bicarbonate

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 腎臓病の診断を受けた人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法用量】

次の量を、食前または食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1.7g	3回
15歳未満	服用しないでください	

添付のサジはすり切り1杯約1.7gです。

〈用法用量に関連する注意〉

用法用量を厳守してください。

【成分分量】

5g（1日量）中 日局炭酸水素ナトリウム 5g含有

【保管及び取扱

い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 紙容器は、においを吸収しやすいため、保管には注意してください。

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

【包

装】

500g