

## さらっと伸びるローションタイプ

### ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

- 使いやすいワンタッチキャップ採用
- ステロイド無配合
- 無着色

### ヘパリン類似物質の作用



### おすすめの使い方

1日1～数回、洗顔後や入浴後などの清潔な肌に手で適量を塗ってください。



お風呂  
上りに!

赤ちゃん  
にも!

健栄製薬(株)お問い合わせ先  
電話番号 (06) 6231-5822  
受付時間 9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造番号  
使用期限

### 【効能効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つぶばり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

### 【用法用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのびせて貼ってください。

### 【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はゆるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

### 【成分分量】

100g中 ヘパリン類似物質 0.3g  
含有 添加物：セトステアリルアルコール、白色ワセリン、グリセリン、2,2',2"-ニトロロトリエタノール、軽質流動パラフィン、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシシル40、モノステアリン酸グリセリン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

# 乾燥肌治療

# ヒルマイルド

## ローション

### ヘパリン類似物質

0.3%配合

60g



無添加

着色料  
不使用

ステロイド  
無配合

第2類医薬品

健栄製薬

第2類医薬品

販売名：  
ヒルマイルドローション

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

### △ 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人。  
(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)
2. 次の部位には使用しないでください  
目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣等)。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 潤滑やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状              |
|------|-----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください